

Nr 60/65.

w.

Utrwalony materiał:

Rozpoznanie kliniczne

Nazwisko

Alkohol

Formol

Syndroma psychoorganicum. Diabete mellitus. Cardioneurosclerosis arteriosclerotica. Insufficiencia circ. sub. finem vitae.

Wiek

60 1.

Rozpoznanie anatomiczne

Dzień śmierci

4.IV.65 r.

1. pół. P. na wys. zw. podst. dobrze rozw.
2. mózdzek.
3. śródmózg.
4. półkula P. z czołem wczesnym.
5. półkula L. ze zw. późnymi.
6. półkula L. ciemę.
7. potylicy P.
8. opuszka.

Atrophia cerebri gradu mediocri. Hyperaemia passiva. Arteriosclerosis III^o. Encephalitis susp.

Status lacunaris Arteriosclerosis

Rozpoznanie histologiczne

Tc

Atrophia lamellaris cerebelli. Oedema cerebri. Atrophia disseminata corticis.

Sekcjonowany

w 48 godzin

po śmierci

Użyte metody barwienia

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

Mrozik - Spielmeyer.
Krezyl.

/M. Raubo/.

Mikrofotografie, rysunki

Uwaga - przewiduje się wtórne zatopienie w parafinie/.

Na wszystkich skrawkach w istocie białej b. duże przestrzenie okołomacyniowe; naczyń najczęściej się w nich nie obserwuje. Przy kilku zachowanych naczyniach małe nacieki limfocytarne najprawdopodobniej symptomatyczne. Przerzedzenia w komórkach kory /mrozik !/ i w zwojach. W mózdzku w istocie białej

pułtio 77

nie równomierne zagęszczenie gleju; małe obrączki nacieków przymaczymiowo.
Warstwa ziarnista kory zachowana - warstwa Purkiniego prawie zanikła -
tu i ówdzie pojedyncze ciemne komórki shomogenizowanych.
Zlecono zatopienie w parafinie wszystkich małych skrawków i dwóch dużych:
fiolet krezyłu i van Gieson.

Prof.dr med. E. Osetowska.