

Nr 83/64.

Nazwisko

Wiek

70 l.

Dzień śmierci

2.4.64 r.

Sekcjonowany

w..... godzin

po śmierci

3.4.64 r.

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

pułko 78

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. rdzeń z miejscem ucisku.
2. rdzeń piersiowy.
3. rdzeń lę-
dźwiowy.
4. nigra.
5. mózdzek.

bl. p

Użyte metody barwienia

Parafina. H-E. v.G.

/K. Kulon/.

Mikrofotografie, rysunki

P-285

<http://rcin.org.pl>

Grenadierów.

Rozpoznanie kliniczne

Carcinoma metastaticum vert.D.V.
cum compresione medullae spinalis.
Paraplegia extremitatis inf. utrius-
que. Carcinoma bronchogenes susp.
Decubitus. Sepsis. Pyelocysticis
chronika.

Rozpoznanie anatomiczne

Cerebrum sine affectione. Laesio
medullae spinalis in reg. thora-
calis.

Rozpoznanie histologiczne

I b

Malacia e compresione medullae
spinalis.

Na poziomie uszkodzenia tkanka
rdzeniowa rozplywa się, przecho-
dząc w luźne siatkowate; wielko-
okie utkanie. Neurony uległy homo-
genizacji, niektóre pozmieniane są
w cienie. W luźnych "okach" tkanki
widoczne skrzepłe kule białkowego
przesięku, barwiące się homogennie
eozynofilnie. Korzonki tylne ob-
rzękkę. Na tymże poziomie naczynia
./.

o ścianach b. grubych zmienionych szklisto. Na poziomie piersiowym
wyższym wyraźny obrzęk korzonków. Neurony zachowane lepiej.

Rdzeń lędźwiowy dobrze zachowany, ma liczne neurony dość mocno atlu-
szczące.

Śródmózgowie bez większych zmian. W mózdzku segmentowane wypadnięcia
komórek Purkinjego. W warstwie ziarnistej mózdzku pojedyncze, przyna-
czyniowe, plackowate opustoczenia.

/Prof.dr med. E. Osetowska/.