

Nr 128/63.

Nazwisko

Wiek

62 1.

Dzień śmierci

10.VI.63 r.

Sekcjonowany 12.VI.63.

w..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

pięsto 69

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. półk. L. wzgórze i ogn. świeże.
 2. skroń P. z ogn. starym.
 3. czoło P. i zwoje.
 4. skroń L. + ammon.
 5. wzgórze P.
 6. Nigra.
 7. most.
 8. czoło
 9. ciemie.
 10. mózdzek.
- /dr Renka-wek/.

kl. φ

Użyte metody barwienia

1-2. - parafina. H-E. v.G.

/M.Rezner/.

Mikrofotografie, rysunki

P. - 312 A

Rozpoznanie kliniczne

Grenadierów.

Arteriosclerosis cerebri hypertensio arterialis. Encephalomalaciae recidivans hemispherii utriusquae. Focus encephalomalaciae recens hemispherii sinistri. Hemiplegia dex. Myodegeneratio cordis.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus haemorrhagicus in reg. vascul. a. c. med. sin. Focus encephalomalaciae inveteratus lobi temporalis dex. Oedema cerebri. Haemorrhagiae sec. trunci cerebri. Status lacunaris.

Rozpoznanie histologiczne

T 6

Focus encephalomalaciae inveterata reg. temporalis.
Haemorrhagia recens thalami.

Stara torbiel porozmięknieniowa w okolicy skroniowej z resztkami makro fagów, obładowanych hemosyderyną oraz dość skąpo proliferującymi fibroblastami. We wzgórzu świeże, okrągłe ognisko krwotoczne, rozpychające tkankę względnie niezmienną. Naczynia w zwojach podstawy wykazują daleko posunięte zmiany miażdżycowe, z

./.

tendencją do zawężenia światła naczyniowego.

Prof. Dr med. E. Osetowska.