

Nr 91/62.

Utrwalony materiał:

Rozpoznanie kliniczne

Gdańsk.

Nazwiska

Alkohol

Formol

Morbus Krabbe /Leukodystrophia/

Zwoje
podstawy.

Oedema cerebri susp.

Skrawek przez
półkule
obejmujący
jądra pod-
stawy.

Rozpoznanie anatomiczne

Hydrocephalus internus per magnus.

Wiek

Dzień śmierci

Rozpoznanie histologiczne

Pudło
6

Meningo - encephalo - ependimitis
probabiliterluetica.

Sekcjonowany

w..... godzin

po śmierci

Użyte metody barwienia

Mrozik. H - E.
Krezyl.

Mikrofotografie, rysunki

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

W oponach nacieki zapalne, przeważ-
nie limfocytarne z pojedynczymi pla-
zmatocytami. Nie przechodzą na korę
w postaci nacieków mezodermalnych,
natomiast w korze szczególnie tem-
poralnej i korze wyspy stwierdza
się wielką ilość typowych pałeczek
Hortegi. Największe nasilenie pro-
cesu stwierdza się w okolicy około-
komorowej. Pojawiają się tam rozle-
głe ogniska ziarniny limfocytarne -

P-249

mikroglejowej z pojedynczymi komórkami Langhansa, przechodzące w ziarnistości nadwyściółkowe. Poza tym w okolicach dalszych od wyściółki widoczne są obfite nacieki limfocytarne przynaczyniowe, wszędzie zagęszczenie gleju astrocytarnego oraz całe ławice pałeczek Hortegi. Proces wymagałby różnicowania z gruźlicą, ale przewlekły przebieg kliniczny, przy stosunkowo świeżym obrazie, dość typowe umiejscowienie oraz olbrzymia ilość mikrogleju przemawia za sprawą kiłową.

/Doc.dr med. E. Osetowska/.