

4. Poliński Wł. dr. i Demel K. Notatki z wycieczki zoologicznej na jeziora Kujawskie. Pam. fizjograf., t. XXVI.

R É S U M É.

L'auteur cite deux endroits, dans lesquels *Anax parthenope* se rencontre en Pologne. On a trouvé cette espèce aux bords du lac de Mikorzyn (jezioro Mikorzyńskie) sur le territoire de Kujawy entre la Vistule et le fleuve Warta (voir Poliński et Demel, 4); l'auteur découvrit sa présence sur le lac de Wigry (jez. Wigierskie), distr. de Suwałki, dans la plate-forme lacustre de Mazourie, sous le 54° 15' de lat. N. Le grand nombre des individus, observés aux bords de ces deux lacs, exclue la supposition, d'après laquelle l'apparition de ces insectes ne serait qu'accidentelle, et permet de considérer *Anax parthenope* comme un habitant des lacs mentionnés ci-dessus; l'aire de dispersion de cette espèce s'étend donc vers le N.-E. beaucoup plus loin, qu'on ne le pouvait supposer.

STEFAN WEISSBERG.

O kilku gatunkach europejskich rodzaju *Dyschirius* Bonelli. (doniesienie tymczasowe). — Sur quelques espèces européennes du genre *Dyschirius* Bonelli. (note préliminaire).

En suivant mes études, qui avaient pour but l'accumulation des matériaux pour une monographie des espèces polonaises du genre *Dyschirius* Bonelli, j'ai eu la chance de trouver quelques stations géographiques inconnues jusqu'à présent, qui jettent une nouvelle lumière sur la dispersion territoriale de certaines formes, et à découvrir plus d'une forme jusqu'à présent inconnue.

Comme l'achèvement de cette monographie peut retarder sa publication, je crois utile de présenter pour le moment au moins quelques faits plus intéressants parmi ceux que j'ai pu constater.

1. *Dyschirius obscurus* Gyll. — mentionné par Müller dans sa monographie des *Dyschirius* européens comme habitant les bords de la mer, „ferner auch an wenigen Punkten im Inneren Nordeuropas nachgewiesen“, est très commun en Pologne sur les rives sablonneuses des fleuves; moi même je l'ai plusieurs

fois trouvé en quantité au bord de la Vistule aux environs de Varsovie, Płock et Ciechocinek, ainsi qu'à Brok (district d'Ostrów) au bord du Bug. Il est donc clair, que la présence de cette espèce n'est en aucune connection avec la présence du sel. Il faut remarquer, que la variété noire est beaucoup plus rare que les spécimens cuivrés.

2. *Dyschirius neresheimeri* Wagn. — décrit et jusqu'à présent connu uniquement de l'Allemagne, paraît être une forme septentrionale. Dans la collection du Musée Polonais d'Histoire Naturelle on trouve des exemplaires de Połaga (N. Memel) recueillis par le docteur Wróblewski, de même que ceux de Kiev; M. Tenenbaum a trouvé quelques spécimens à Urle au Nord-est de Varsovie. Ceci démontre que l'espèce précitée occupe tout le territoire de la plaine sarmatique et la partie ouest de la plate-forme russe. Il est à remarquer que cette espèce ne dépasse jamais la limite de l'extention glacière.

3. Parmi les insectes de la collection de M. Simon Tenenbaum se trouve un spécimen qui mérite une attention spéciale. C'est une forme, appartenant au groupe *nitidus* Dej., et qui est d'après moi la plus voisine du *D. politus* Dej., mais différant de celui-ci par le manque de chagrin à la base des élytres et par la présence de trois, au lieu de deux, comme chez *politus*, pores sétigères à la troisième interstrie dorsale; du *nitidus* d'autre côté il se distingue par sa forme cylindrique et mince aussi que par ses dimensions et par ses pattes beaucoup plus claires. Outre cela, contrairement à tous les *Dyschirius* que j'ai eu l'occasion d'examiner, il se distingue par sa couleur franchement bleue, qui ne change pas même après le lavage au xylol ou à l'éthère sulfurique. C'est, je le suppose, le seul *Dyschirius* connu d'une couleur décidément voyante. Ses autres caractères comme: deux pores préapicales; une post-humérale, une basale, la manière de la ponctuation des élytres, la structure des tibias antérieures et son habitus général, rappelant le plus le *D. politus* Dej., je considère cette forme seulement comme une variété de l'espèce dernièrement mentionnée et je propose pour elle le nom *Dyschirius politus* Dej. var. *stronczyński* nov. en honneur du premier carabidologiste polonais Casimir Stronczyński (*1809 †1896). Patria: Łomianki, environs de Varsovie.

4. *Dyschirius lüdersi* Wagn. — J'ai trouvé quelques dizaines d'exemplaires de cette espèce sur un tout petit pré, couvert de *Salicornia herbacea* et de *Spergularia salina*, dans les salines de Ciechocinek. Il y a aussi dans la collection du Musée Polonais d'Histoire Naturelle quelques exemplaires provenant de Połaga (N. Memel).

5. *Dyschirius strumosus* Er. — Comme la station située le plus au Nord de l'habitat de cette espèce méridionale on a considéré jusqu'à présent les environs de Vienne (Neusiedler-See). L'année passée j'ai trouvé un spécimen de cette espèce avec le *D. lüdersi* Wagn. à Ciechocinek; en outre le Musée Dzieduszycki à Léopol (Lwów) possède un exemplaire, provenant de la Galicie orientale—il faudrait donc déplacer la limite de sa dispersion à quelques centaines de kilomètres vers le Nord.

6. *Dyschirius angustatus* Ahr. — espèce habitant les parties méridionales et occidentales de l'Europe centrale. Parmi les insectes que j'ai pu étudier il faut citer ceux, dont les localités méritent être notés: Ciechocinek (leg. J. Wańkiewicz, coll. Mus. Pol. Hist. Nat.), Olsza, environs de Cracovie (leg. M. Łomnicki, coll. Mus. Dzied.), Kosów (Hal. or. leg. M. Łomnicki, coll. Mus. Dzied.), Kołomyja (leg. J. Łomnicki), Varsovie (leg. L. Hildt). Ce sont les stations de cette espèce les plus avancées vers le Nord-est¹).

STRESZCZENIE.

Autor, znalazłszy nowe stanowisko geograficzne kilku gatunków rodzaju *Dyschirius* Bonelli, przesuwając znacznie granice ich zasięgu i opisuje nową formę z grupy *D. nitidus* Dej., którą nazywa *Dyschirius politus* Dej. var. *stronczyński* nov.; poza tem autor prostuje błędne, a przyjęte w nauce, mniemanie jakoby *D. obscurus* Gyll. był gatunkiem solankowym.